

# *Arcyria minuta* Buchet (=A. gulielmae)



Legs Bernadette & Jean-Louis Martin (n° 2697, 01 Civrieux, Les Allagniers le 26-10-2006). En suivant la clé de Neubert & al. (Trad. FR) ; fructifications avec des teintes rouges, capillitium solidement fixé à la cupule (quand on souffle ou qu'on tire un peu il ne se détache pas) et pas très élastique (quand on le tire il ne s'étend pas mais se casse)  
sporocarpes rose-saumon à roses, puis se décolorant en beige, sporocarpes en grands groupes, capillitium (3-5  $\mu\text{m}$  de diam) à forte ornementation = *A. minuta*. Si sporocarpes isolés ou en petits groupes et capillitium (2-3  $\mu\text{m}$  de diam) à faible ornementation voir *A. insignis*. Le capillitium chez *A. insignis* se décolore dans le Hoyer's au point de ne presque plus le voir dans la préparation au bout de qlq minutes. En se basant sur la couleur, *A. minuta* pourrait être confondu avec *A. incarnata* mais l'ornementation du capillitium chez ce dernier est plus complexe et le capillitium n'est pas aussi solidement fixé à la cupule. *A. cinerea* a des couleurs très variables mais jamais avec une teinte rose-saumon, le capillitium est orné seulement d'épines et distinctement plus épais dans la partie centrale du sporange. *A. denudata* est plus large, plus grand et de couleur plus rouge foncé. *A. corymbosa* a un capillitium plus faiblement orné.



Capillitium qui ne se décolore pas dans Hoyer's après qlq minutes