

Didymium minus (Lister) Morgan.



Leg. Bernadette & Jean-Louis Martin (très répandu dans les feuilles mortes).
Mémo ; en suivant la clé de Neubert et al. ; sporocarps stipités voir 18, stipe sans calcaire voir 21, péricarpium brun par transparence, divisé par des traits clairs en taches bien délimitées rappelant le pelage de la girafe (sous micro) voir 22, stipe court, dépassant à peine le diamètre du sporocarpe, souvent caché dans l'ombilic de la base, à peine diaphane, parfois commun à plusieurs sporocarps, tessellures du péricarpium assez grandes, brun mat voir 23, tessellures du péricarpium de grandeur moyenne, dépassant à peine 100 µm. Fructifications en général nettement stipitées, spores 8-10 µm, claires, finement verruqueuses, avec des groupes de verrues plus sombres = *D. minus*. Si tessellures plus grandes, jusqu'à 200 µm, souvent perforées, fructifications souvent sessiles en apparence, spores 10-14 µm, sombres, couvertes de verrues toutes semblables = *D. melanosporium*. Si stipe nettement plus long que le diamètre du sporocarpe, élancé, diaphane brun-rouge par transparence et tessellures du péricarpium petites, ne dépassant pas 50 µm, d'un brun-rouge intense, voir [*D. nigripes*](#).

